



Clinique vétérinaire Kerzouvet

8 rue Albert Le Brun
29400 LANDIVISIAU
02.98.68.13.28

www.kerzouvet.bzh

landivisiau@kerzouvet.bzh

Clinique Vétérinaire Kerzouvet Landivisiau

9 rue Charles Le Goffic
29450 ST POL DE LEON
02.98.29.14.24

www.kerzouvet.bzh

stpoldeleon@kerzouvet.bzh

Clinique Vétérinaire Kerzouvet Saint Pol De Leon



NOTE D'INFORMATION - FCO/MHE

SITUATION SANITAIRE

Comme prévu, avec la reprise de l'activité vectorielle en mai-juin, **la circulation de la FCO (Fièvre Catarrhale Ovine) a été constatée dans le Finistère dès la mi-juillet**. Après la confirmation des premiers cas dans le Finistère Sud le 9 juillet, la maladie s'est étendue, avec des foyers confirmés dans le centre du Finistère la semaine suivante. Nous avons également identifié un premier foyer le 21 juillet.

Au total, au mois de juillet, plus de 200 suspicions ont été signalées dans notre département, dont plus de 100 ont été confirmées comme foyers de FCO, avec **une accélération marquée des signalements ces derniers jours**. Deux variants de la FCO sont actuellement en circulation : les sérotypes 3 et 8. Aucun cas de MHE (Maladie Hémorragique Enzootique) n'a été signalé en Bretagne pour le moment.

CARACTÉRISTIQUES DES MALADIES

Il s'agit de maladies virales transmises par des insectes piqueurs. **Aucun traitement spécifique n'existe pour ces maladies**. On se contente de traiter les animaux en fonction des symptômes observés pour les aider à supporter la maladie et en limiter les effets néfastes.

Les signes cliniques sont similaires pour les deux maladies et peu spécifiques :

- Conjonctivite, larmolement, yeux exorbités, œdème autour des yeux.
- Érosions, ulcères, croûtes, et gonflement du mufle.
- Jetage nasal.
- Érosions, ulcères, croûtes sur la mamelle et les trayons.
- Œdème des pieds et des pattes, associé à des boiteries et une démarche raide.

Étant donné que ces maladies réglementées sont à déclaration obligatoire, toute suspicion doit être confirmée par un vétérinaire.

Outre l'impact immédiat (soins aux animaux, baisse de production, mortalité potentielle), **ces maladies peuvent également avoir des effets à moyen et long terme** comme des avortements, des problèmes d'infertilité, et des naissances de veaux non viables.

PRÉVENTION GÉNÉRALE

Pour limiter la propagation de la maladie, nous vous recommandons les mesures suivantes :

- **Renforcer le système immunitaire** de vos animaux en augmentant l'apport de Compléments Minéraux et Vitaminés (CMV).
- **Maintenir une excellente hygiène dans vos bâtiments et leurs alentours** afin de réduire la prolifération des insectes.
- Mettre en place un **protocole de désinsectisation de vos bâtiments**.
- **Éliminer toutes les zones d'eau stagnante autour des bâtiments** pour limiter la prolifération des insectes.
- **Éviter de laisser vos animaux à l'extérieur durant les périodes d'activité vectorielle maximale**, soit environ deux heures avant et après le lever et le coucher du soleil, dans la mesure du possible.
- En cas d'animal présentant des symptômes, il est crucial de l'isoler immédiatement, de le traiter contre les insectes, et de consulter un vétérinaire pour établir un diagnostic.

VACCINATION

Pour ceux qui le souhaitent, **la vaccination reste possible** sous réserve de disponibilité des vaccins. Voici les détails :

MALADIE	VACCIN	VOIE D'INJECTION	PROTOCOLE	COUT DES 2 INJECTIONS
MHE8	HEPIZOVAC	4 ml en SC	2 injections à 3 semaines d'intervalle	9,12 euros HT
FCO3	BULTAVO 3	1 ml en IM		5,50 euros HT
FCO8	BLUEVAC 8	4 ml en SC		4,49 euros HT

Cela représente jusqu'à trois vaccins pour une protection optimale. Si vous souhaitez faire un choix, **il est difficile d'étayer une priorité fondée sur des bases scientifiques solides à ce jour**. D'après **les retours informels des vétérinaires de terrain** dont nous disposons, la MHE semble être la plus préoccupante, tandis que la FCO de sérotype 8 serait la moins sévère. Ces informations restent cependant à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer dans les semaines à venir.

Si vous optez pour la vaccination, **il est possible d'administrer les vaccins le même jour, à condition d'utiliser des points d'injection distincts ainsi que des seringues et aiguilles séparées**. Il est également conseillé de **sortir les vaccins du réfrigérateur deux heures avant leur administration** et de préparer votre troupeau avec une cure d'oligo-éléments et de vitamines.

Pour une efficacité maximale, **il est recommandé de vacciner l'ensemble du troupeau**.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute question et vous tiendrons informés de toute évolution significative.

Vos vétérinaires